

## Salud sexual de los latinos jóvenes en Estados Unidos



Diciembre 2001

Hoy en día, cerca de la mitad de los latinos<sup>1</sup> en bachillerato en EE.UU. son sexualmente activos, una tasa comparable con la de los jóvenes en general.<sup>2</sup> Aun cuando la tasa de embarazos entre las adolescentes está declinando, sigue siendo alta entre las latinas, y ha venido declinando en una forma más lenta que entre otros grupos étnicos y raciales.<sup>3</sup> El VIH/SIDA ha impactado desproporcionadamente a la población latina. Los adolescentes latinos representan en el momento aproximadamente el 20% de los casos de SIDA informados entre su grupo de edad, mientras que representan el 14% de la población.<sup>4</sup> Las tasas para otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) de más prevalencia también son más altas entre los latinos.<sup>4</sup>

A muchos jóvenes latinos les preocupa y quieren saber más sobre asuntos de salud sexual, tales como cómo protegerse contra el VIH/SIDA. Más de la mitad de los latinos entre 18 y 29 años (59%) dicen que personalmente les preocupa llegar a infectarse con el VIH y muchos quieren más información, tal como a dónde ir para hacerse la prueba (60%) y cómo hablar con la pareja (50%).<sup>5</sup>


### Actividad sexual entre adolescentes

- El 45% de las latinas en los grados 9 a 12 han tenido relaciones sexuales, comparado con 44,8% de blancas y 66,9% de afroamericanas en los mismos cursos.<sup>6</sup>
- El 63% de los latinos en los grados 9 a 12 han tenido relaciones sexuales, comparado con 45,4% de blancos y 75,7 % de afroamericanos en los mismos cursos.<sup>6</sup>
- Aproximadamente 9% de los estudiantes latinos en los grados 9 a 12 han tenido relaciones sexuales antes de los 13 años, comparado con 5,5 por ciento de blancos y 20,5 por ciento de afroamericanos en los mismos cursos.<sup>2</sup>



### Uso de anticonceptivos

- Entre los estudiantes en los grados 9 a 12, sexualmente activos en la actualidad<sup>7</sup>, 55,2% de los latinos informaron haber usado condón la última vez que tuvieron relaciones sexuales, comparado con 55% de blancos y 70% de afroamericanos en los mismos cursos.<sup>2</sup>
- Entre los estudiantes en los grados 9 a 12, sexualmente activos en la actualidad<sup>7</sup>, 7,8% de latinos informaron que ellos o sus parejas usaron anticonceptivos orales como métodos de control natal la última vez que tuvieron relaciones sexuales, comparado con 21% de blancos y 7,7 % de afroamericanos en los mismos cursos.<sup>2</sup>
- En general, 59% de latinas entre los 15 y los 44 años usan algún tipo de control natal, incluida la esterilización, comparado con 66% ciento de blancas y 62% de afroamericanas en el mismo grupo de edad.<sup>8</sup>



## Embarazos y partos

- La *tasa de embarazos* para las latinas adolescentes entre 15 y 19 años es de 148,7 por cada 1000. Las tasas de embarazos para las adolescentes blancas y afroamericanas de la misma edad son de 65,1 y 170,4 respectivamente. Entre las adolescentes latinas menores de 15 años, la tasa de embarazo es de 3,9 por 1000, comparado con 1,1 y 7,7 para blancas y afroamericanas de la misma edad.<sup>3</sup>
- Las tasas de embarazo para las adolescentes latinas entre 15 y 19 años declinaron un 11% entre 1994 y 1997. Las tasas de embarazo declinaron más entre las adolescentes blancas (26%) y las afroamericanas (23%) que entre las latinas durante el mismo periodo.<sup>3</sup>
- La *tasa de partos* para las adolescentes latinas entre 15 y 19 años es de 97,4 por cada 1000, la cual es más alta que la tasa de partos para blancas y afroamericanas de la misma edad: 36,0 y 90,8, respectivamente. Entre las latinas más jóvenes, de menos de 15 años, la tasa de partos es de 2,3 por 1000, comparado con 0,4 para blancas y 3,4 para afroamericanas de la misma edad.<sup>3</sup>
- Las latinas en Estados Unidos tienen entre cuatro y cinco embarazos durante su vida (promedio: 4,7), de los cuales 2,6 son deseados.<sup>9</sup> En comparación, las mujeres blancas tienen en promedio 2,8 embarazos, 1,6 de los cuales son deseados; y las mujeres afroamericanas tienen en promedio 5,1 embarazos, de los cuales 1,8 son deseados.<sup>3</sup>
- La *tasa de embarazo no programado* para las latinas entre 15 y 44 años es de 69 por cada 1000 mujeres, casi dos veces la tasa para blancas (36 por 1000), pero menor que la tasa de 99 por 1000 para afroamericanas de la misma edad.<sup>10</sup>

## VIH/SIDA

- Los adolescentes latinos han sido afectados por el VIH/SIDA en forma desproporcionada. Aunque los jóvenes latinos representan aproximadamente 14% de los adolescentes estadounidenses, se les atribuye el 20 por ciento de los casos nuevos de SIDA informados en 2000 entre quienes tienen de 13 a 19 años.<sup>4</sup>
- En general, el SIDA es la cuarta causa de muerte entre los latinos de 25 a 44 años de edad. El SIDA es la segunda causa de muerte entre los afroamericanos y la quinta causa de muerte entre los blancos en el mismo grupo de edad.<sup>11</sup>
- El 49% de los latinos entre los 18 y los 29 años dicen que el SIDA es un problema "muy" grave para las personas que conocen. Incluso más (59%) dicen que están personalmente preocupados por la posibilidad de infectarse con VIH/SIDA.<sup>5</sup>
- El 59% de los latinos entre 18 y 29 años informan que les han hecho la prueba del VIH.<sup>5</sup> Estos hallazgos pueden exagerar un poco la tasa real de pruebas del VIH entre los latinos. Por ejemplo, de quienes dicen que los han examinado, el 12% cree incorrectamente que las pruebas del VIH son parte rutinaria de un examen.<sup>5</sup>

## Otras enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Se estima que hay 15,3 millones de casos nuevos de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en los Estados Unidos cada año.<sup>12</sup> Dos terceras partes de todos los casos nuevos de ETS ocurren entre personas que tienen menos de

25 años.<sup>13</sup> Todos los años, tres millones de adolescentes (cerca de 1 de cada 4 adolescentes sexualmente activos) se infectan.<sup>6</sup>

- Hubo 2.564,2 casos informados de clamidias por 100.000 latinas entre los 10 y los 19 años, comparado con 1.190,8 casos entre las blancas y 7.786,3 casos entre las afroamericanas de la misma edad. Hubo 371,2 casos informados de clamidias por 100.000 hombres latinos entre los 10 y los 19 años, comparado con 100,6 casos entre los blancos y 1.256,2 casos entre los afroamericanos de la misma edad.<sup>6</sup>
- La tasa de gonorrea entre los latinos aumentó de 67,4 casos por 100.000 personas en 1997, a 75,3 en 1999.<sup>14</sup> Hubo 320,8 casos informados de gonorrea por 100.000 latinas entre los 10 y los 19 años, comparado con 218,2 casos entre las blancas y 3.851,7 casos entre las afroamericanas de la misma edad. Hubo 155,5 casos informados de gonorrea por 100.000 hombres latinos entre los 10 y los 19 años, comparado con 41,7 casos entre los blancos y 2.075,9 casos entre los afroamericanos de la misma edad.<sup>6</sup>

## Referencias

- <sup>1</sup> El censo estadounidense utiliza el término "hispano" como una categoría estadística para personas de los países de habla española. "Latino" es intercambiable con "hispano" en este informe.
- <sup>2</sup> MMWR June 9, 2000, 49(SS05);1-96, Youth Risk Behavior Surveillance—U.S. 1999.
- <sup>3</sup> Ventura SJ et al., Trends in Pregnancy Rates for the United States, 1976-97: An Update, National Vital Statistics Reports, Vol. 49, Number 4, June 6, 2001.
- <sup>4</sup> CDC, HIV/AIDS Surveillance in Adolescents L265 slide series (through 2000).
- <sup>5</sup> Fundación de la Familia Kaiser, Cómo ven los latinos la epidemia del VIH/SIDA después de 20 años. Hallazgos de una encuesta nacional, noviembre 2001.
- <sup>6</sup> MacKay AP, Fingerhut LA, Duran CR, Adolescent Health Chartbook. Health, United States, 2000. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2000.
- <sup>7</sup> La encuesta del comportamiento de riesgo entre jóvenes define "sexualmente activo en la actualidad", como haber tenido relaciones sexuales durante los tres meses anteriores a la entrevista de la encuesta.
- <sup>8</sup> Piccinino L and W Mosher, Trends in Contraceptive Use in the United States: 1982-1995, Family Planning Perspectives, 30(1), 1998.
- <sup>9</sup> Los Informes de Estadísticas Vitales Nacionales definen un parto como "deseado" si la madre dice que antes o al momento de quedar embarazada ella deseaba tener otro hijo.
- <sup>10</sup> Henshaw S, Unintended Pregnancy in the United States, Family Planning Perspectives, 30(1), 1998, 26, 28.
- <sup>11</sup> NCHS, National Vital Statistics Report, 48(11), July 24, 2000.
- <sup>12</sup> American Social Health Association and Kaiser Family Foundation, Sexually Transmitted Diseases in America: How Many Cases and at What Cost?, 1998.
- <sup>13</sup> Eng, TR, and Butler, WT, eds, The Hidden Epidemic: Confronting Sexually Transmitted Diseases, Washington, D.C.: National Academy Press, 1997.
- <sup>14</sup> CDC, Tracking the Hidden Epidemics, Trends in STDs in the United States, 2000.

Se pueden obtener copias adicionales de esta publicación (#3199), a través de la línea telefónica para pedido de publicaciones: 1-800-656-4533.